

2024.06
Debut!

ハイブリーチから脱染まで きめ細かく対応する「アリミノ ブリーチ OX」



リタッチブリーチの脱色・脱染力を
制御するブリーチ用2剤

NEW アリミノ ブリーチ OX 6%

酸化剤 / 過酸化水素配合
1200g 医薬部外品

配合成分

- アミノ酸プレックス※ (毛髪保護)
- 流動パラフィン (エモリエント剤)
- ミリスチン酸イソプロピル (エモリエント剤)
- パルミチン酸2-エチルヘキシル (エモリエント剤)



脱色・脱染力を最低限に
制御するブリーチ用2剤

NEW アリミノ ブリーチ OX 1%

酸化剤 / 過酸化水素配合
1200g 医薬部外品

配合成分

- アミノ酸プレックス※ (毛髪保護)
- 流動パラフィン (エモリエント剤)
- ミリスチン酸イソプロピル (エモリエント剤)
- パルミチン酸2-エチルヘキシル (エモリエント剤)

※L-グルタミン酸

使い方

薬剤調合について

[ブリーチ 120] : [ブリーチ OX (6% / 1%)]
1 : 2

放置時間

自然放置 10~40分

プロセス

STEP 1.	カウンセリング	STEP 7.	放置(常温)
STEP 2.	薬剤選定	STEP 8.	カラーチェック
STEP 3.	プロテクト(頭皮:プロテクト・髪:前処理)	STEP 9.	ブレーンリンス
STEP 4.	セクショニング	STEP 10.	シャンプー・ブレーンリンス
STEP 5.	薬剤調合	STEP 11.	トリートメント・ブレーンリンス
STEP 6.	薬剤塗布		ドライ / オンカラー施術へ

アリミノ ブリーチ 120 × OX 6%・1%で均一なベースづくりをサポート

Point
01

ブリーチ力

2種類のOXで
様々な履歴に対応

Point
02

操作性

ブリーチワークを
追及したクリーム

Point
03

ケア力

適度な反応や
塗布時の摩擦を軽減

製品の詳細はこちら→



高性能のブリーチ力とクリーミーな操作性、 ムラになりにくいパウダーブリーチ




アリミノ ブリーチ 120

脱色・脱染剤 / 過硫酸塩配合

500g 医薬部外品

新生毛をしっかり明るくできる、 高性能のブリーチ力

過硫酸カリウム×過硫酸アンモニウム配合の独自バランス。
ハイトーンを表現できる、確かなブリーチ力。
2剤でコントロールすれば、明るさの表現幅が広がります。



クリーミーで塗布しやすい、 きめ細かなパウダータイプ

ダマにならずに混ざりやすく、粉が舞いにくいパウダー設計です。
2剤と均一に混合できるため、
ムラのない安定したブリーチ力を発揮します。



使用時のご注意

- ご使用の際は脱色・脱染剤(第1剤)の使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
- 過硫酸塩配合の製品でかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。
 - 本品は過硫酸塩配合の製品で、アレルギー反応をおこすことがあります。
 - 1剤:2剤 = 1:2でご使用ください。2剤の比率を下げると薬剤の粘度が高くなり、ブリーチ力も下がります。
 - 混合直後すぐに塗布してください。時間とともに、ブリーチ力が弱まります。

※塗布前のストランド(毛束)テストのすすめ

前回のカラー剤の種類によっては、希望の明るさにならないケースがあるので、髪の毛の履歴を的確に見極める必要があります。デザイン的にあまり影響されない後頭部内側から毛束を取り、ブリーチ剤を塗布しホイールで包み、15分前後放置、リフト力を確認します。

ARIMINO

株式会社アリミノ

お客さま窓口 0120-945-334

受付時間 / 9:00~17:00 (祝日、年末年始を除く月~金曜日)

※写真はイメージです。

2024 © ARIMINO Co., Ltd. all rights reserved 「著作権」 24.04.